叶兴阳
双语音标有声读物
叶兴阳;
双语音标
阅读创始人
注音阅
读英语
教育之父
English
注音阅读英语教育之父

叶兴阳双语音标有声读物

双语对照 · 音标注音 · 有声同步

编者： *叶兴阳*

内容来源： *公共领域英文原著*

适用对象： *英语学习者、教师、研究者*

版本日期： *2025 年*

目录

共 1 个章节

1. 科阿韦拉州的一种新蝙蝠（细毛蝠(a New Bat (genus Leptonycteris) From) 000001

使用说明

- 本目录为大字打印优化版本，正文字号 18pt，适合纸质阅读
- 电子版请访问对应 HTML 文件，支持语音播放功能
- 建议双面打印，左侧留白已优化，便于装订
- 章节标题已按字母顺序排列，便于快速查找

科阿韦拉州的一种新蝙蝠（细毛蝠(A New Bat (Genus Leptonycteris) From)
第1/1页

[ˌjuːnɪ'vɜːsəti][ɒv; əv]['kænzəs] [ˌpʌblɪ'keɪʃnz]
University of Kansas Publications
大学 的 堪萨斯州 出版物

堪萨斯大学出版社

[mju'ziːəm][ɒv; əv]['nætʃ(ə)rəl]['hɪstri; 'hɪstəri]
Museum of Natural History
博物馆 的 自然的 历史

自然历史博物馆

['vɒljuːm] [naɪn] , [nəʊ] . - , [ˌpiː 'piː] . - - -
Volume 9 , No . 10 , pp . 353 - 356
体积 9 , 不 . - , pp . - - -

第9卷，第10期，第353-356页

['dʒænjuəri] - , -
January 21 , 1957
一月 - , -

1957年1月21日

[ə; eɪ] [njuː] [bæt] (['dʒiːnəs] -)
A New Bat (Genus Leptonycteris)
一个 新的 蝙蝠 (属 -)

一种新的蝙蝠（Leptonycteris属）

[frɒm; frəm][ˌkoʊə'wiːlə]
From Coahuila
从 科阿韦拉

来自科阿韦拉

[baɪ]
BY
经过

经过

['haʊəd] [dʒeɪ] . [steɪnz]
HOWARD J . STAINS
霍华德 J . 污渍

霍华德·J·斯坦斯

[ˌjuːnɪ'vɜːsəti][ɒv; əv]['kænzəs]
University of Kansas
大学 的 堪萨斯州

堪萨斯大学

Lawrence1957
Lawrence1957
Lawrence1957

劳伦斯1957

[ˌjuːnɪ'vɜːsəti][ɒv; əv]['kænzəs] [ˌpʌblɪ'keɪʃnz] , [mju'ziːəm][ɒv; əv]['nætʃ(ə)rəl]['hɪstri; 'hɪstəri]
University of Kansas Publications , Museum of Natural History
大学 的 堪萨斯州 出版物 , 博物馆 的 自然的 历史

堪萨斯大学自然历史博物馆出版物

['editəz] : [iː] . ['reɪmənd] [hɔːl] , ['tʃeəmən] , ['henri] [es] . [fɪtʃ] , ['hærɪs(ə)n][biː] . ['tɔːrdɔːf]
Editors : E . Raymond Hall , Chairman , Henry S . Fitch , Harrison B . Tordoff
编辑 : E . 雷蒙德 大厅 , 主席 , 亨利 S . 惠誉 , 哈里森 B . 托尔多夫

编辑：E·雷蒙德·霍尔（主席）、亨利·S·菲奇、哈里森·B·托多夫

['vɒljuːm] [naɪn] , [nəʊ] . - , [ˌpiː 'piː] . - - -
Volume 9 , No . 10 , pp . 353 - 356
体积 9 , 不 . - , pp . - - -

第9卷，第10期，第353-356页

['pʌblɪʃt] ['dʒænjuəri] - , -
Published January 21 , 1957
已发布 一月 - , -

发表于1957年1月21日

[ˌjuːnɪ'vɜːsəti][ɒv; əv]['kænzəs]
University of Kansas
大学 的 堪萨斯州

堪萨斯大学

['lɒrəns] , ['kænzəs]
Lawrence , Kansas
劳伦斯 , 堪萨斯州

堪萨斯州劳伦斯

['prɪntɪd] [baɪ]
PRINTED BY
打印 经过

印刷者

[fɜːrd] [vɔɪlənd] , [ˌdʒeɪ 'ɑːr] . , [steɪt] ['prɪntə(r)]
FERD VOILAND , JR . , STATE PRINTER
费尔德 沃兰德 , JR . , 状态 打印机

FERD VOILAND, JR.，国家印刷商

[tə'piːkə] , KANSAS1957
TOPEKA , KANSAS1957
托皮卡 , KANSAS1957

堪萨斯州托皮卡，1957年

[ə; eɪ] [njuː] [bæt] (['dʒiːnəs] -)
A New Bat (Genus Leptonycteris)
一个 新的 蝙蝠 (属 -)

一种新的蝙蝠（Leptonycteris属）

[frɒm; frəm][ˌkoʊə'wiːlə]
From Coahuila
从 科阿韦拉

来自科阿韦拉

[baɪ]
by
经过

经过

['haʊəd] [dʒeɪ] . [steɪnz]
howard j . stains
霍华德 j . 污渍

霍华德·J·斯坦斯

[ə'sɪstənt] [prə'fesə(r)] , [dɪ'pɑːtmənt] [ɒv; əv] [zu'ɒlədʒi] , ['sʌðən] [ˌɪlə'nɔɪz] [ˌjuːnɪ'vɜːsəti]
Assistant Professor , Department of Zoology , Southern Illinois University
助手 教授 , 部门 的 动物学 , 南方 伊利诺伊州 大学

南伊利诺伊大学动物学系助理教授

[ɪn][ə; eɪ] [kə'lekʃ(ə)n] [ɒv; əv] ['mæm(ə)lz] [əb'teɪnd] [ɪn][ˌkoʊə'wiːlə] , ['mɛksɪˌkoʊ] , [ðeə(r)][ɪz][ə; eɪ]['sɪəriːz][ɒv; əv] - [lɒŋ] - [nəʊzd] [bæts] ,
In a collection of mammals obtained in Coahuila , México , there is a series of 24 long - nosed bats ,
在 一个 收藏 的 哺乳动物 获得 在 科阿韦拉 , 墨西哥 , 那里 是 一个 系列 的 - 长的 - 鼻子 蝙蝠 ,

在墨西哥科阿韦拉州获得的一批哺乳动物标本中，有24只长鼻蝙蝠。

- [naɪ'veɪlɪs] .
Leptonycteris nivalis .
- 雪崩 .

雪地细长线虫。

[ðiːz] [bæts][hæv; həv][ə; eɪ]['lɑːdʒə(r)] [skʌl] [ænd; ənd][ə; eɪ][lɒŋgə(r)] [θɜːd] ['fɪŋgə(r)][ðæn; ðən]['ʌðə(r)][bæts] [ɒv; əv] [ðɪs] ['spiːʃiːz] [faʊnd] [tuː; tə][ðə; ði] [saʊθ] [ɒv; əv][ˌkoʊə'wiːlə] .
These bats have a larger skull and a longer third finger than other bats of this species found to the south of Coahuila .
这些 蝙蝠 有 一个 更大的 颅骨 和 一个 更长 第三 手指 比 其他 蝙蝠 的 这 物种 成立 到 这 南 的 科阿韦拉 .

这些蝙蝠的头骨比在科阿韦拉州南部发现的同种蝙蝠更大，第三指更长。

[ɒn] [ðə; ði]['beɪsɪs][ɒv; əv] [ðiːz] [dɪ'stɪŋktɪv] ['kærəktəz] ,
On the basis of these distinctive characters ,
在 这 基础 的 这些 独特的 人物 ,

基于这些独特的特征，

[ˌaɪ 'tiː] [siːm] [ə'prəʊpriət] [tuː; tə] ['rekəgnaɪz] [ðiːz] [lɒŋ] - [nəʊzd] [bæts][frɒm; frəm][ˌkoʊə'wiːlə][æz; əz] [bɪ'lɒŋɪŋ] [tuː; tə][ə; eɪ] [njuː] ['sʌbspiːʃiːz] ,
it seems appropriate to recognize these long - nosed bats from Coahuila as belonging to a new subspecies ,
它 似乎 合适的 到 认出 这些 长的 - 鼻子 蝙蝠 从 科阿韦拉 作为 属于 到 一个 新的 亚种 ,

似乎应该将来自科阿韦拉州的这些长鼻蝙蝠认定为一个新的亚种。

[nemd] [ænd; ənd] [dɪ'skraɪbd] [æz; əz] [f'ɒləʊz] :
named and described as follows :
命名 和 描述 作为 跟随 :

名称和描述如下：

- [naɪ'veɪlɪs] - [njuː] ['sʌbspiːʃiːz]
Leptonycteris nivalis longala new subspecies
- 雪崩 - 新的 亚种

雪松细螨新亚种

[taɪp] . — ['fiːmeɪl] , ['ædʌlt; ə'dʌlt] , [skɪn] [ænd; ənd] [skʌl] , [nəʊ] . - , ['juːnɪv] .
Type . — Female , adult , skin and skull , No . 33087 , Univ .
类型 . — 女性 , 成人 , 皮肤 和 颅骨 , 不 . - , 大学 .

类型.—雌性，成年，皮肤和头骨，编号 33087，大学。

['kænzəs] [mʌs] .
Kansas Mus .
堪萨斯州 音乐 .

堪萨斯博物馆

[næt] . [hɪst] . ; - [miː] . [es][ænd; ənd][ˌtuː'tuː][miː] .
Nat . Hist . ; 12 mi . S and 2 mi .
纳特 . 历史 . ; - 米 . S 和 2 米 .

自然历史；南 12 英里，南 2 英里。

[iː][ˌɑːrteɪ'ɑːgə] , - [ˌef 'tiː] . , [ˌkoʊə'wiːlə] ; - [dʒʊ'laɪ] - ; [əb'teɪnd] [baɪ]['dʌbljuː] . [keɪ] . [klɑ:k] ,
E Arteaga , 7500 ft . , Coahuila ; 11 July 1949 ; obtained by W . K . Clark ,
E 阿尔特加 , - 英尺 . , 科阿韦拉 ; - 七月 - ; 获得 经过 W . K . 克拉克 ,
[ə'rɪdʒən(ə)l]['nʌmbə(r)] - .
original number 787 .
原来的 数字 - .

E Arteaga，海拔 7500 英尺，科阿韦拉州；1949 年 7 月 11 日；由 WK Clark 获得，原始编号 787。

[reɪndʒ] . — ['sʌðən] [ˌkoʊə'wiːlə] [nɔːθ] [tuː; tə][ðə; ði][bɪg] [bend] (['bruːstə(r)] ['kaʊnti]) [ɒv; əv] ['teksəs] .
Range . — Southern Coahuila north to the Big Bend (Brewster County) of Texas .
范围 . — 南方 科阿韦拉 北 到 这 大的 弯曲 (布鲁斯特 县) 的 德克萨斯州 .

分布范围：从科阿韦拉州南部向北延伸至德克萨斯州的大弯区（布鲁斯特县）。

[ˌdaɪəg'nəʊsɪs] . — [saɪz] [lɑːdʒ] ([siː] ['meʒəm(ə)nts]) ; [θɜːd] ['fɪŋgə(r)] [lɒŋ] ; ['kʌlə(r)] [peɪl] ,
Diagnosis . — Size large (see measurements) ; third finger long ; color pale ,
诊断 . — 尺寸 大的 (看 测量) ; 第三 手指 长的 ; 颜色 苍白 ,

诊断结果——尺寸偏大（见测量数据）；第三指较长；颜色苍白。

['ʌpərˌpɑːrts] [heə(r)] [braʊn] (['kæpɪtəlaɪzd]['kʌlə(r)] [tɜːmz] [ɑː(r); ə(r)]['ɑːftə(r)] ['rɪdʒˌweɪ] , ['kʌlə(r)] ['stændədz]
upperparts Hair Brown (capitalized color terms are after Ridgway , Color Standards
上半身 头发 棕色的 (资本化 颜色 条款 是 后 里奇韦 , 颜色 标准
[ænd; ənd]['kʌlə(r)] [nə'meŋklətʃə(r)] ,
and Color Nomenclature ,
和 颜色 命名法 ,

上身毛发棕色（大写的颜色术语参考 Ridgway 的《颜色标准和颜色命名法》，

['wɒʃɪŋtən] , [diː] . [siː] . , -) , ['ʌndəpɑːt] [sməʊk] [greɪ] ; [skʌl] [lɑːdʒ] [ænd; ənd] [brɔːd] .
Washington , D . C . , 1912) , underparts Smoke Gray ; skull large and broad .
华盛顿 , D . C . , -) , 下半身 抽烟 灰色的 ; 颅骨 大的 和 广阔 .

华盛顿特区，1912 年出生），下体呈烟灰色；头骨大而宽。

[kəm'pærəsnz] . — [frɒm; frəm] - [naɪ'veɪlɪs][naɪ'veɪlɪs] (['spesəmən] [frɒm; frəm][,verə'kru:z] ,
Comparisons . — From Leptonycteris nivalis nivalis (specimens from Veracruz ,
比较 . — 从 - 雪崩 雪崩 (标本 从 韦拉克鲁斯 ,
[wə'hɑːkə] , [dɪ'striːtoʊ] ['fedərəl] , [hɪ'dælgəʊ] , [hɑː'lɪskə] , [ænd; ənd] ['sɒnərə]) ,
Oaxaca , Distrito Federal , Hidalgo , Jalisco , and Sonora) ,
瓦哈卡 , distrito 联邦 , 伊达尔戈 , 哈利斯科 , 和 索诺拉) ,

比较——来自雪毛细蝠（标本来自韦拉克鲁斯州、瓦哈卡州、联邦区、伊达尔戈州、哈利斯科州和索诺拉州），

[el] . [en] . - ['difəz] [æz; əz] [f'ɒləʊz] : ['kʌlə(r)]['peɪlə(r)] , [mɔː(r)] ['waɪtɪʃ] [ænd; ənd] [les] ['braʊnɪʃ] ;
L . n . longala differs as follows : color paler , more whitish and less brownish ;
L . n . - 不同 作为 跟随 : 颜色 肤色较浅 , 更多的 白色 和 较少的 棕褐色 ;

L. n. longala 的区别如下：颜色较浅，更偏白色，棕色较少；

[θɜːd] ['fɪŋgə(r)][lɒŋgə(r)] (- [frɒm; frəm][ˌkoʊə'wiːlə]['æv(ə)rɪdʒɪŋ] - . [θriː][əm əm] . ; [naɪ'veɪlɪs]
third finger longer (longala from Coahuila averaging 111 . 3 mm . ; nivalis
第三 手指 更长 (- 从 科阿韦拉 平均值 - . 3 毫米 . ; 雪崩
[frɒm; frəm] ['sɒnərə] ['æv(ə)rɪdʒɪŋ] - . - ,
from Sonora averaging 91 . 0 ,
从 索诺拉 平均值 - . - ,

第三指较长（来自科阿韦拉州的longala平均为111.3毫米；来自索诺拉州的nivalis平均为91.0毫米），

[frɒm; frəm][hɑː'lɪskə] - . [fɔːr] , [frɒm; frəm][hɪ'dælgəʊ] - . - , [frɒm; frəm][,verə'kru:z] - . - , [frɒm; frəm]
from Jalisco 96 . 4 , from Hidalgo 98 . 0 , from Veracruz 100 . 0 , from
从 哈利斯科 - . 4 , 从 伊达尔戈 - . - , 从 韦拉克鲁斯 - . - , 从
[dɪ'striːtoʊ] ['fedərəl] - . [ˌtuː'tuː] ,
Distrito Federal 100 . 2 ,
distrito 联邦 - . 2 ,

来自哈利斯科州的96.4，来自伊达尔戈州的98.0，来自韦拉克鲁斯州的100.0，来自墨西哥城的100.2，

[ænd; ənd][frɒm; frəm][wə'hɑːkə] - . [sɪks]) ; [skʌl] ['lɑ:dʒə(r)] , [bredθ] [ɒv; əv]['kreɪniəm]['greɪtə(r)] (
and from Oaxaca 98 . 6) ; skull larger , breadth of cranium greater (
和 从 瓦哈卡 - . 6) ; 颅骨 更大的 , 宽度 的 颅骨 更大的 (
- [frɒm; frəm][ˌkoʊə'wiːlə]['æv(ə)rɪdʒɪŋ] - . ['sɛvən][əm əm] . ;
longala from Coahuila averaging 10 . 7 mm . ;
- 从 科阿韦拉 平均值 - . 7 毫米 . ;

（来自瓦哈卡 98.6）头骨较大，颅骨宽度较大（来自科阿韦拉的 longala 平均为 10.7 毫米）。

[naɪ'veɪlɪs][frɒm; frəm]['sɒnərə][naɪn] . [eit] , [frɒm; frəm][hɑː'lɪskə][naɪn] . [eit] , [frɒm; frəm][hɪ'dælgəʊ][naɪn] .
nivalis from Sonora 9 . 8 , from Jalisco 9 . 8 , from Hidalgo 9 .
雪崩 从 索诺拉 9 . 8 , 从 哈利斯科 9 . 8 , 从 伊达尔戈 9 .
[sɪks] , [frɒm; frəm][ˌverə'kru:z][naɪn] . [naɪn] ,
6 , from Veracruz 9 . 9 ,
6 , 从 韦拉克鲁斯 9 . 9 ,

来自索诺拉州的雪量为 9.8，来自哈利斯科州的雪量为 9.8，来自伊达尔戈州的雪量为 9.6，来自韦拉克鲁斯州的雪量为 9.9。

[frɒm; frəm][dɪ'striːtoʊ] ['fedərəl] [naɪn] . [naɪn] , [ænd; ənd][frɒm; frəm][wə'hɑːkə][naɪn] . [eit]) ; [mæ'stɒɪdəl]
from Distrito Federal 9 . 9 , and from Oaxaca 9 . 8) ; mastoidal
从 distrito 联邦 9 . 9 , 和 从 瓦哈卡 9 . 8) ; 乳突
[bredθ] ['greɪtə(r)] (- [frɒm; frəm][ˌkoʊə'wiːlə]['æv(ə)rɪdʒɪŋ] - . [sɪks][əm əm] .
breadth greater (longala from Coahuila averaging 11 . 6 mm .
宽度 更大的 (- 从 科阿韦拉 平均值 - . 6 毫米 .

来自 Distrito Federal 9.9，来自 Oaxaca 9.8）；乳突宽度较大（来自 Coahuila 的 longala 平均为 11.6 毫米）。

; [naɪ'veɪlɪs][frɒm; frəm]['sɒnərə] - . [faɪv] , [frɒm; frəm][hɑː'lɪskə] - . [eit] , [frɒm; frəm][hɪ'dælgəʊ] - . [sɪks] ,
; nivalis from Sonora 10 . 5 , from Jalisco 10 . 8 , from Hidalgo 10 . 6 ,
; 雪崩 从 索诺拉 - . 5 , 从 哈利斯科 - . 8 , 从 伊达尔戈 - . 6 ,
[frɒm; frəm][ˌverə'kru:z] - . [naɪn] ,
from Veracruz 10 . 9 ,
从 韦拉克鲁斯 - . 9 ,

;索诺拉州的雪量为10.5，哈利斯科州的雪量为10.8，伊达尔戈州的雪量为10.6，韦拉克鲁斯州的雪量为10.9，

[frɒm; frəm][dɪ'striːtoʊ] ['fedərəl] - . [eit] , [ænd; ənd][frɒm; frəm][wə'hɑːkə] - . ['sɛvən]) ; [skʌl] ['haɪə(r)] (
from Distrito Federal 10 . 8 , and from Oaxaca 10 . 7) ; skull higher (
从 distrito 联邦 - . 8 , 和 从 瓦哈卡 - . 7) ; 颅骨 更高 (
- [frɒm; frəm][ˌkoʊə'wiːlə]['æv(ə)rɪdʒɪŋ] - . - [əm əm] . ;
longala from Coahuila averaging 10 . 0 mm . ;
- 从 科阿韦拉 平均值 - . - 毫米 . ;

来自墨西哥联邦区的 10.8 毫米，来自瓦哈卡的 10.7 毫米）；头骨较高（来自科阿韦拉的 longala 平均为 10.0 毫米）。

[naɪ'veɪlɪs][frɒm; frəm]['sɒnərə][naɪn] . [θriː] , [frɒm; frəm][hɑː'lɪskə][naɪn] . [ˌtuː'tuː] , [frɒm; frəm][hɪ'dælgəʊ][naɪn]
nivalis from Sonora 9 . 3 , from Jalisco 9 . 2 , from Hidalgo 9
雪崩 从 索诺拉 9 . 3 , 从 哈利斯科 9 . 2 , 从 伊达尔戈 9
. [ˌtuː'tuː] , [frɒm; frəm][ˌverə'kru:z][naɪn] . [θriː] ,
. 2 , from Veracruz 9 . 3 ,
. 2 , 从 韦拉克鲁斯 9 . 3 ,

来自索诺拉州的雪量为 9.3，来自哈利斯科州的雪量为 9.2，来自伊达尔戈州的雪量为 9.2，来自韦拉克鲁斯州的雪量为 9.3。

[frɒm; frəm][dɪ'striːtoʊ] ['fedərəl] [naɪn] . [θriː] , [ænd; ənd][frɒm; frəm][wə'hɑːkə][naɪn] . [wʌn]) .
from Distrito Federal 9 . 3 , and from Oaxaca 9 . 1) .
从 distrito 联邦 9 . 3 , 和 从 瓦哈卡 9 . 1) .

来自 Distrito Federal 9.3，以及来自 Oaxaca 9.1）。

[ðə; ði] ['ævərɪdʒ] [ɒv; əv] [iːtʃ] [daɪ'menʃ(ə)n][ɒv; əv] - ['lɪstɪd] [ə'bʌv] [ik'si:d] [ðə; ði]['mæksɪməm][ɒv; əv]
The average of each dimension of longala listed above exceeds the maximum of
这 平均的 的 每个 方面 的 - 列出 多于 超过 这 最大限度 的
[ðə; ði] [ˌkɒrə'spɒndɪŋ] [daɪ'menʃ(ə)n][ɪn][naɪ'veɪlɪs] .
the corresponding dimension in nivalis .
这 相应的 方面 在 雪崩 .

上述 longala 各维度的平均值均大于 nivalis 中相应维度的最大值。

[rɪ'mɑːrks] . — - [naɪ'veɪlɪs] - [in'hæbit][ðə; ði] [ˌnɔːθ'iːstən] [end][ɒv; əv][ðə; ði]
Remarks . — Leptonycteris nivalis longala inhabits the northeastern end of the
评论 . — - 雪崩 - 居住地 这 东北部 结尾 的 这
['meksɪkən] ['plætəʊ] .
Mexican Plateau .
墨西哥 高原 .

备注.—Leptonycteris nivalis longala 栖息于墨西哥高原的东北端。

[bæts][frɒm; frəm]['bruːstə(r)] ['kaʊnti] , ['teksəs] , [rɪ'fɜːd] [tuː; tə] - ,
Bats from Brewster County , Texas , referred to longala ,
蝙蝠 从 布鲁斯特 县 , 德克萨斯州 , 指 到 - ,

来自德克萨斯州布鲁斯特县的蝙蝠，被称为longala，

['ævərɪdʒ] ['slaɪtli] ['lɑːdʒə(r)][ɪn][ɔːl] ['meʒəm(ə)nts] ['teɪkən][ðæn; ðən][duː; də] ['spesəmən] [frɒm; frəm]
average slightly larger in all measurements taken than do specimens from
平均的 轻微地 更大的 在 全部 测量 已采取 比 做 标本 从
['sʌðən] [ˌkoʊə'wiːlə] .
southern Coahuila .
南部 科阿韦拉 .

在所有测量数据中，平均尺寸略大于来自科阿韦拉州南部的样本。

['spesəmən] [frɒm; frəm]['sɛroʊ][pə'toʊsiː] , [ˌmjuːnɪ'sɪpɪəʊ][diː][geɪliːænə] , ['nweɪvoʊ][lei'əun] ,
Specimens from Cerro Potosí , Municipio de Galeana , Nuevo León ,
标本 从 塞罗 波托西 , 市政 德 加莱阿纳 , 新 莱昂 ,

标本来自新莱昂州加利阿纳市波托西山，

['ɔːlsəʊ][ɑː(r); ə(r)] [rɪ'fɜːd] [tuː; tə] - [ɒn][ðə; ði]['beɪsɪs][ɒv; əv][ðə; ði][leŋkθ; leŋθ][ɒv; əv][ðeə(r)] [θɜːd]
also are referred to longala on the basis of the length of their third
还 是 指 到 - 在 这 基础 的 这 长度 的 他们的 第三
['fɪŋgəz] .
fingers .
手指 .

根据第三根手指的长度，他们也被称为长指人。

[laɪk] [ðə; ði] ['spesəmən] [frɒm; frəm] ['teksəs] , [ðiːz] [bæts] [pə'zes] [lɒŋgə(r)] ['fɔːrɑːm] , [ɒn][ðə; ði]
Like the specimens from Texas , these bats possess longer forearms , on the
喜欢 这 标本 从 德克萨斯州 , 这些 蝙蝠 具有 更长 前臂 , 在 这
['ævərɪdʒ] ,
average ,
平均的 ,

与德克萨斯州的标本一样，这些蝙蝠的前臂平均而言更长。

[ðæn; ðən][duː; də][bæts][frɒm; frəm][ˌkoʊə'wiːlə] .
than do bats from Coahuila .
比 做 蝙蝠 从 科阿韦拉 .

比科阿韦拉州的蝙蝠还要多。

['tɒpətaɪp] [ɒv; əv][el] . [en] . [naɪ'veɪlɪs][frɒm; frəm] [maʊnt] [ˌɔːri'zɑːbə; ˌɔːriː'sɑːvɑː][wɜː(r); wə(r)] [nɒt] [ə'veɪləb(ə)l]
Topotypes of L . n . nivalis from Mount Orizaba were not available
拓扑类型 的 L . n . 雪崩 从 山 奥里萨巴 是 不是 可用的
,
,
,

来自奥里萨巴山的 L. n. nivalis 的模式标本尚未获得。

[bʌt; bət] - ['spesəmən] [rɪ'fɜːrəbl; 'refrəbl][tuː; tə][ðə; ði] ['sʌbspiːʃiːz] [naɪ'veɪlɪs][wɜː(r); wə(r)] [ɪg'zæmɪnd] .
but 111 specimens referable to the subspecies nivalis were examined .
但 - 标本 可参考的 到 这 亚种 雪崩 是 检查 .

但检查了 111 个可归为亚种 nivalis 的标本。

[ðiːz] ['spesəmən] [wɜː(r); wə(r)][frɒm; frəm][ðə; ði] ['fɒləʊɪŋ] ['pleɪsɪz] : ['sɒnərə] : ¼ [miː] . ['dʌbljuː][ə'dwɑːnə]
These specimens were from the following places : Sonora : ¼ mi . W Aduana
这些 标本 是 从 这 下列的 地方 : 索诺拉 : ¼ 米 . W 海关
, - [ˌef 'tiː] . , [fɔːr] ['spesəmən] .
, 1600 ft . , 4 specimens .
, - 英尺 . , 4 标本 .

这些标本来自以下地点：索诺拉州：阿杜阿纳以西 ¼ 英里，海拔 1600 英尺，4 个标本。

[hɑː'lɪskə] : [ˌeɪtʃˌdiː'eɪ] .
Jalisco : Hda .
哈利斯科 : 高清 .

哈利斯科：Hda。

[sæn; sɑːn]['mɑːrˌtiːn] , - [ˌef 'tiː] . , - [miː] . ['dʌbljuː] [tʃə'pɑːlə] , [θriː] ; - [miː] . ['dʌbljuː] [tʃə'pɑːlə] ,
San Martín , 5000 ft . , 18 mi . W Chapala , 3 ; 11 mi . W Chapala ,
圣 马丁 , - 英尺 . , - 米 . W 查帕拉 , 3 ; - 米 . W 查帕拉 ,

圣马丁，5000 英尺，18 英里W查帕拉，3； 11 英里。 W查帕拉，

- [ˌef 'tiː] . , [wʌn] ; [faɪv][miː] . ['dʌbljuː] [tʃə'pɑːlə] , - [ˌef 'tiː] . , - ; [eit][miː] . [ˌen 'iː] - , -
5000 ft . , 1 ; 5 mi . W Chapala , 5000 ft . , 58 ; 8 mi . NE Ocotlán , 5100
- 英尺 . , 1 ; 5 米 . W 查帕拉 , - 英尺 . , - ; 8 米 . 东北 - , -
[ˌef 'tiː] . , [wʌn] .
ft . , 1 .
英尺 . , 1 .

5000 英尺，1； 5 英里。 W 查帕拉，5000 英尺，58； 8 英里。奥科特兰东北部，5100 英尺，1。

[hɪ'dælgəʊ] : [sɪks][ˌkeɪ 'em] .
Hidalgo : 6 km .
伊达尔戈 : 6 公里 .

伊达尔戈：6 公里。

[ˌɛn'dʌbəljuː] , - [ˌef 'tiː] . , [wʌn] .
NW Tasquillo , 500 ft . , 1 .
西北 塔斯基洛 , - 英尺 . , 1 .

西北塔斯奎洛，500 英尺，1。

[ˌverə'kruːz] : [θriː][ˌkeɪ 'em] .
Veracruz : 3 km .
韦拉克鲁斯 : 3 公里 .

韦拉克鲁斯：3公里。

['dʌbljuː]['boʊkə][del]['riːoʊ] , - [ˌef 'tiː] . , - .
W Boca del Río , 25 ft . , 22 .
W 博卡 del 里奥 , - 英尺 . , - .

W Boca del Río，25 英尺，22。

[dɪ'striːtoʊ] ['fedərəl] :
Distrito Federal :
distrito 联邦 :

Distrito Federal:

- , ['sɛroʊ] - , 2⅖ [miː] . [ˌɛnˌɛn'dʌbljuː]['mɪlpə]['æltə] , - [ˌef 'tiː] . , - .
Chicomostoc , Cerro Teutli , 2⅖ mi . NNW Milpa Alta , 2620 ft . , 18 .
- , 塞罗 - , 2⅖ 米 . 西北偏北 米尔帕 阿尔塔 , - 英尺 . , - .

Chicomostoc，Cerro Teutli，2⅖ 英里。米尔帕阿尔塔西北，2620 英尺，18。

[wə'hɑːkə] : - , - [ˌef 'tiː] . , [wʌn] ; [θriː][ˌkeɪ 'em] .
Oaxaca : Cuicatlán , 600 ft . , 1 ; 3 km .
瓦哈卡 : - , - 英尺 . , 1 ; 3 公里 .

瓦哈卡州：Cuicatlán，600 英尺，1； 3公里。

[ˌdʌbəljuː ɛn ˈdʌbəljuː] - , - [ˌef ˈtiː] . , [ˌtuːˈtuː] .
WNW Dominguillo , 730 ft . , 2 .
西西北 - , - 英尺 . , 2 .

WNW Dominguillo，730 英尺，2。

[ɔːl] [ðiːz] [ˈspesəmən] [ɑː(r); ə(r)][ɪn][ðə; ði][mjuˈziːəm][ɒv; əv][ˈnætʃ(ə)rəl][ˈhɪstri; ˈhɪstəri][æt; ət][ðə; ði]
All these specimens are in the Museum of Natural History at the
全部 这些 标本 是 在 这 博物馆 的 自然的 历史 在 这
[ˌjuːnɪˈvɜːsəti][ɒv; əv][ˈkænzəs] .
University of Kansas .
大学 的 堪萨斯州 .

这些标本都收藏于堪萨斯大学自然历史博物馆。

[ˈlɪt(ə)l] [dɪˈsɜːnəb(ə)l] [ˌdʒiːəˈgræfɪk] [ˌveəriˈeɪʃ(ə)n][wɒz; wəz] [faʊnd] [ɪn] [ðiːz] [ˈspesəmən] [ɒv; əv][el] . [en] .
Little discernible geographic variation was found in these specimens of L . n .
小的 可辨别的 地理 变化 曾是 成立 在 这些 标本 的 L . n .
[naɪˈveɪlɪs] .
nivalis .
雪崩 .

在这些 L. n. nivalis 标本中，几乎没有发现明显的地理变异。

[nəʊ] [ˈspesəmən] [kʊd; kəd] , [wɪð] [ˈsɜːt(ə)nti] , [biː; bi] [klˈɑːst] [æz; əz] [ˈɪntəˌgreɪd] [bɪˈtwiːn] -
No specimens could , with certainty , be classed as intergrades between longala
不 标本 可以 , 和 肯定 , 是 分类 作为 中间级 之间 -
[ænd; ənd][naɪˈveɪlɪs] ,
and nivalis ,
和 雪崩 ,

没有标本可以确定地被归类为longala和nivalis之间的过渡类型。

[bʌt; bət][ˌaɪ ˈtiː][ɪz] [θɔːt] [ðæt] [ˈɪntəˌgreɪd] [wɪl] [biː; bi] [faʊnd] [ɪn] [ˈwestən] [sæn; sɑːn][ˈlwis; ˈlwiʃ][pəˈtoʊsiː]
but it is thought that intergrades will be found in western San Luis Potosí
但 它 是 想法 那 中间级 将要 是 成立 在 西 圣 路易斯 波托西
[ɔː(r)][ɪn][ˌsɑːkɑːˈtekəs][ɔː(r)][ɪn][bəuθ] [steɪts] .
or in Zacatecas or in both states .
或者 在 萨卡特卡斯 或者 在 两个都 各州 .

但人们认为，在圣路易斯波托西州西部或萨卡特卡斯州，或者这两个州都会发现杂交品种。

[dælkwɛst] ([ˈmæm(ə)lz] [ɒv; əv][ðə; ði][ˈmeksɪkən] [steɪt] [ɒv; əv][sæn; sɑːn][ˈlwis; ˈlwiʃ][pəˈtoʊsiː] , [luˌiːziˈænə]
Dalquest (Mammals of the Mexican State of San Luis Potosí , Louisiana
达尔奎斯特 (哺乳动物 的 这 墨西哥 状态 的 圣 路易斯 波托西 , 路易斯安那州
[steɪt] [ˈjuːnɪv] .
State Univ .
状态 大学 .

Dalquest（墨西哥圣路易斯波托西州的哺乳动物，路易斯安那州立大学）

[ˈstʌdiz] , [ˈbaɪəl] .
Studies , Biol .
研究 , 生物学 .

研究，生物学。

[ˈsaɪ] .
Sci .
科学 .

科学。

[sɪə] .
Ser .
ser .

序列

[nəʊ] . [wʌn] , [ˌpiː ˈpiː] .
No . 1 , pp .
不 . 1 , pp .

第 1 期，第 1 页

- - - , -) [ri'fə:z] [faɪv] ['spesəmən] ['teɪkən][frɒm; frəm][ˌeɪtʃˌdiː'eɪ] .
27 - 28 , 1953) refers five specimens taken from Hda .
- - - , -) 指 五 标本 已采取 从 高清 .

1953 年 27-28 日）指的是从 Hda 采集的五个标本。

- , [ˌsaʊθ'iːstən] [sæn; sɑːn]['lwis; 'lwiʃ][pə'toʊsiː] , [tuː; tə][el] . [en] . [naɪ'veɪlɪs] .
Capulín , southeastern San Luis Potosí , to L . n . nivalis .
- , 东南部 圣 路易斯 波托西 , 到 L . n . 雪崩 .

卡普林 (Capulín)，圣路易斯波托西东南部，至 L. n.尼瓦利斯。

['meʒəm(ə)nts] [baɪ] [dælkwɛst] [ɑː(r); ə(r)][ɪn] [ə'kɔːd(ə)ns] [wɪð] ['ʌðə(r)] ['meʒəm(ə)nts] [ɒv; əv][el] . [en] .
Measurements by Dalquest are in accordance with other measurements of L . n .
测量 经过 达尔奎斯特 是 在 根据 和 其他 测量 的 L . n .
[naɪ'veɪlɪs] ['lɪstɪd] [ə'bʌv] .
nivalis listed above .
雪崩 列出 多于 .

Dalquest 的测量结果与上面列出的 L. n. nivalis 的其他测量结果一致。

[ðə; ði] [neɪm] [el] . [en] . - [mɑːr'tiːnez][ænd; ənd] ['vɪlə] ,
The name L . n . yerbabuenae Martinez and Villa ,
这 姓名 L . n . - 马丁内斯 和 别墅 ,

名称 L. n. yerbabuenae Martinez 和 Villa，

[wɒz; wəz] [beɪst] [ɒn] ['spesəmən] [frɒm; frəm] [jɝːbəbwnə] [ɪn][ðə; ði] [steɪt] [ɒv; əv] [gɛ'rɛroʊ] .
was based on specimens from Yerbabuena in the state of Guerrero .
曾是 基于 在 标本 从 耶尔巴布埃纳 在 这 状态 的 格雷罗 .

以格雷罗州耶尔巴布埃纳的标本为研究对象。

[ðə; ði] ['spesəmən] , [ɪn'kluːdɪŋ] [ðə; ði] ['hɒlətaɪp] , [ɒn] [wɪtʃ] [ðɪs] [neɪm] [wɒz; wəz] [beɪst] [hæv; həv] [biːn]
The specimens , including the holotype , on which this name was based have been
这 标本 , 包括 这 正模标本 , 在 哪个 这 姓名 曾是 基于 有 到过
[dɪ'strɔɪd] .
destroyed .
损毁 .

该名称所依据的标本，包括正模标本，均已被销毁。

['lwis; 'lwiʃ][diː][lɑː] ['tɔːri] ([ˌfiːldi'ænə] , - : - ,
Luis de la Torre (Fieldiana , 37 : 698 ,
路易斯 德 拉 托雷 (菲尔迪亚纳 , - : - ,

路易斯·德拉托雷（Fieldiana，37：698，

-) [ɪg'zæmɪnd] [ə; eɪ] ['tɒpətaɪp] [ɒv; əv] - [ænd; ənd][wɒz; wəz][ʌn'eɪb(ə)l][tuː; tə] [dɪ'stɪŋgwɪʃ]
1955) examined a topotype of yerbabuenae and was unable to distinguish
-) 检查 一个 拓扑型 的 - 和 曾是 无法 到 区分
[ðɪs] ['spesɪmən] [frɒm; frəm][ə; eɪ] ['tɒpətaɪp] [ɒv; əv][naɪ'veɪlɪs][frɒm; frəm][,ɔ:ri'zɑ:bə; ,ɔ:ri:'sɑ:vɑ:] .
this specimen from a topotype of nivalis from Orizaba .
这 标本 从 一个 拓扑型 的 雪崩 从 奥里萨巴 .

1955 年）检查了 yerbabuenae 的模式标本，但未能将该标本与来自 Orizaba 的 nivalis 的模式标本区分开来。

['deɪvɪs][ænd; ənd] ['rʌsəl] ([dʒɜː(r)] . ['mæm] . , - : - , -) [aɪ'dentɪfaɪd][æz; əz][el] . [en] . [naɪ'veɪlɪs]
Davis and Russell (Jour . Mamm . , 33 : 236 , 1952) identified as L . n . nivalis
戴维斯 和 罗素 (一天 . 乳房 . , - : - , -) 已识别 作为 L . n . 雪崩
[wʌn][bæt][frɒm; frəm][mə'reɪlɑːs] ,
one bat from Morelos ,
一 蝙蝠 从 莫雷洛斯 ,

Davis 和 Russell（Jour. Mamm., 33: 236, 1952）将来自莫雷洛斯的一只蝙蝠鉴定为 L. n. nivalis，

['teɪkən] [ə'prɒksɪmətli] - [maɪlz] [ˌen 'iː] [ɒv; əv] [ðə; ði] [taɪp] [ləʊ'kæləti] [ɒv; əv] - ,
taken approximately 32 miles NE of the type locality of yerbabuenae ,
已采取 大约 - 英里 东北 的 这 类型 地点 的 - ,

采集于 yerbabuenae 模式产地东北方向约 32 英里处，

['nəʊtɪŋ] [ðæt] [ɪts] [θɜːd] ['fɪŋgə(r)] [wɒz; wəz] [mʌtʃ] [ʃɔːtə] [ðæn; ðən] [ɪn] ['spesəmən] [frɒm; frəm] [ðə; ði] [bɪg]
noting that its third finger was much shorter than in specimens from the Big
注意到 那 它是 第三 手指 曾是 很多 较短 比 在 标本 从 这 大的

[bend] [ɒv; əv] ['teksəs] .
Bend of Texas .
弯曲 的 德克萨斯州 .

值得注意的是，它的第三根手指比德克萨斯州大弯地区的标本短得多。

[ai] [dʒʌdʒ] [el] . [en] . - [tuː; tə] [biː; bi] [ə; eɪ] ['sɪnənɪm] [ɒv; əv] [naɪ'veɪlɪs] [æz; əz] [dʌz] [diː] [lɑː]
I judge L . n . yerbabuenae to be a synonym of nivalis as does de la
我 法官 L . n . - 到 是 一个 代名词 的 雪崩 作为 做 德 拉

['tɔːri] .
Torre .
托雷 .

我和 de la Torre 一样，认为 L. n. yerbabuenae 是 nivalis 的同义词。

[ək'nɒlɪdʒmənt] [ɪz] [meɪd] [tuː; tə] ['dɑːktər; draɪv] . ['dʌbljuː] . [biː] . ['deɪvɪs] [ɒv; əv] [ðə; ði] [ˌægrɪ'kʌltʃərəl]
Acknowledgment is made to Dr . W . B . Davis of the Agricultural
致谢 是 制成 到 博士 . W . B . 戴维斯 的 这 农业

[ænd; ənd] [mə'kænɪkl] ['kɒlɪdʒ] [ɒv; əv] ['teksəs] [ænd; ənd] ['mɪstə(r)] . [ˌkɒlɪn] [siː] . ['sænbɔːn] [ɒv; əv] [ðə; ði]
and Mechanical College of Texas and Mr . Colin C . Sanborn of the
和 机械的 大学 的 德克萨斯州 和 先生 . 科林 C . 桑伯恩 的 这

[ʃɪ'kɑːgəʊ] ['nætʃ(ə)rəl] ['hɪstri; 'hɪstəri] [mju'ziːəm] [fɔː(r); fə(r)] [ləʊn] [ɒv; əv] [kəm'pærətɪv] [mə'tɪəriəl] .
Chicago Natural History Museum for loan of comparative material .
芝加哥 自然的 历史 博物馆 为了 贷款 的 比较 材料 .

谨此感谢德克萨斯州农业机械学院的 WB Davis 博士和芝加哥自然历史博物馆的 Colin C. Sanborn 先生借出对比材料。

[ai] [ˌeɪ 'em] ['greɪtf(ə)l] ['ɔːlsəʊ] [tuː; tə] [ðə; ði] ['kænzəs] [ˌjuːnɪ'vɜːsəti] [ɪn'daʊmənt] [əˌsəʊsi'eɪʃn; əˌsəʊʃi'eɪʃn] [ænd; ənd]
I am grateful also to the Kansas University Endowment Association and
我 是 感激的 还 到 这 堪萨斯州 大学 捐赠基金 协会 和

['næʃ(ə)nəl] ['saɪəns] [faʊn'deɪʃ(ə)n] [fɔː(r); fə(r)] [sə'pɔːt] [ɒv; əv] [fiːld] [wɜːk] ,
National Science Foundation for support of field work ,
国家的 科学 基础 为了 支持 的 场地 工作 ,

我还要感谢堪萨斯大学捐赠协会和国家科学基金会对野外工作的支持。

[ænd; ənd] [tuː; tə] ['dɑːktər; draɪv] . ['rɔlin] [eɪtʃ] . ['beɪkə(r)] [fɔː(r); fə(r)] ['gaɪd(ə)ns] [ɪn] [maɪ] ['stʌdi] .
and to Dr . Rollin H . Baker for guidance in my study .
和 到 博士 . 罗林 H . 贝克 为了 指导 在 我的 学习 .

感谢 Rollin H. Baker 博士在我的研究中给予的指导。

['meʒəm(ə)nts] . — [ðə; ði] ['fɒləʊɪŋ] ['meʒəm(ə)nts] [ɪn] ['milimiːtəz] [ɪn'kluːd] [ðəʊz] [ɒv; əv] [ðə; ði]
Measurements . — The following measurements in millimeters include those of the
测量 . — 这 下列的 测量 在 毫米 包括 那些 的 这

[taɪp] ,
type ,
类型 ,

测量单位——下列以毫米为单位的测量单位包括以下类型的测量单位：

[ænd; ənd] [ðə; ði] ['ævərɪdʒ] [ænd; ənd] [ɪk'striːm] ['meʒəm(ə)nts] [ɒv; əv] [ðə; ði] [taɪp] [ænd; ənd] -
and the average and extreme measurements of the type and 22
和 这 平均的 和 极端 测量 的 这 类型 和 -

['ædʌlt; ə'dʌlt] ['tɒpətaɪp] :
adult topotypes :
成人 拓扑类型 :

以及该类型和 22 个成年地形型的平均值和极端值：

['təʊt(ə)l][leŋkθ; leŋθ] , - , - (- - -) ; [leŋkθ; leŋθ][ɒv; əv][haɪnd] [fʊt] , - , - (- - -) ;
total length , 79 , 79 (73 - 86) ; length of hind foot , 16 , 16 (14 - 17) ;
全部的 长度 , - , - (- - -) ; 长度 的 后 脚 , - , - (- - -) ;
[leŋkθ; leŋθ][ɒv; əv][ɪə(r)] ,
length of ear ,
长度 的 耳朵 ,

总长度，79，79（73-86）；后足长度，16，16（14-17）；耳长，

- , - . [faɪv] (- - -) ; [leŋkθ; leŋθ][ɒv; əv] ['fɔːrɑːm] , - . - , - . [sɪks] (- . [θriː] - - . -) ;
16 , 16 . 5 (15 - 17) ; length of forearm , 50 . 0 , 50 . 6 (47 . 3 - 55 . 0) ;
- , - . 5 (- - -) ; 长度 的 前臂 , - . - , - . 6 (- . 3 - - . -) ;
['greɪtɪst] [leŋkθ; leŋθ][ɒv; əv] [skʌl] ,
greatest length of skull ,
最 长度 的 颅骨 ,

16，16.5（15-17）；前臂长度，50.0，50.6（47.3-55.0）；头骨最大长度，

- . [wʌn] , - . [faɪv] (- . [wʌn] - - . -) ; [ˌzaɪgəʊ'mætɪk] [bredθ] , [naɪn] . [ˌtuː'tuː] , [naɪn] . [sɪks] ([eit]
28 . 1 , 27 . 5 (26 . 1 - 29 . 0) ; zygomatic breadth , 9 . 2 , 9 . 6 (8
- . 1 , - . 5 (- . 1 - - . -) ; 颧骨 宽度 , 9 . 2 , 9 . 6 (8
. [sɪks] - - . [ˌtuː'tuː]) ; [ˌɪntər'ɔːbɪt(ə)l] [kən'strɪkʃn] , [fɔːr] . [sɪks] , [fɔːr] . [eit] ([fɔːr] . [wʌn] - [faɪv] . [fɔːr]) ;
. 6 - 11 . 2) ; interorbital constriction , 4 . 6 , 4 . 8 (4 . 1 - 5 . 4) ;
. 6 - - . 2) ; 轨道间 收缩 , 4 . 6 , 4 . 8 (4 . 1 - 5 . 4) ;

28.1, 27.5 (26.1-29.0)；颧宽，9.2, 9.6 (8.6-11.2)；眶间收缩，4.6, 4.8 (4.1-5.4)；

[mæ'stɒɪdəl] [bredθ] , - . ['sɛvən] , - . [sɪks] (- . - - - . [wʌn]) ; [bredθ] [ɒv; əv] ['breɪnˌkeɪs] , - .
mastoidal breadth , 11 . 7 , 11 . 6 (11 . 0 - 12 . 1) ; breadth of braincase , 10 .
乳突 宽度 , - . 7 , - . 6 (- . - - - . 1) ; 宽度 的 脑壳 , - .
[faɪv] , - . ['sɛvən] (- . [wʌn] - - . [ˌtuː'tuː]) ; ['greɪtɪst] [haɪt] [ɒv; əv] [skʌl] ,
5 , 10 . 7 (10 . 1 - 11 . 2) ; greatest height of skull ,
5 , - . 7 (- . 1 - - . 2) ; 最 高度 的 颅骨 ,

乳突宽度，11.7，11.6（11.0-12.1）；脑颅宽度，10.5，10.7（10.1-11.2）；颅骨最大高度，

[naɪn] . [eit] , - . - ([naɪn] . [sɪks] - - . [faɪv]) ; [æl'viːələ(r)][leŋkθ; leŋθ][ɒv; əv][mæk'sɪləri] [tuːθ] - [rəʊ] ,
9 . 8 , 10 . 0 (9 . 6 - 10 . 5) ; alveolar length of maxillary tooth - row ,
9 . 8 , - . - (9 . 6 - - . 5) ; 肺泡 长度 的 上颌 齿 - 排 ,
[eit] . [naɪn] , [naɪn] . [wʌn] ([eit] . [faɪv] - [naɪn] . [sɪks]) ; [ænd; ənd][leŋkθ; leŋθ][ɒv; əv] [θɜːd] ['fɪŋgə(r)] , - .
8 . 9 , 9 . 1 (8 . 5 - 9 . 6) ; and length of third finger , 110 .
8 . 9 , 9 . 1 (8 . 5 - 9 . 6) ; 和 长度 的 第三 手指 , - .
[eit] , - . [θriː] (- . [naɪn] - - . [wʌn]) .
8 , 111 . 3 (106 . 9 - 116 . 1) .
8 , - . 3 (- . 9 - - . 1) .

9.8，10.0（9.6-10.5）；上颌牙列牙槽长度，8.9，9.1（8.5-9.6）；第三指长度，110.8，111.3（106.9-116.1）。

['spesəmən] [ɒv; əv][el] . [en] . -
Specimens of L . n . longala
标本 的 L . n . -

L. n. longala 的标本

[ɪg'zæmɪnd] . — ['təʊt(ə)l]['nʌmbə(r)] , - , [æz; əz] [f'ɒləʊz] : ['teksəs] : [keɪv] ['dʌbljuː][saɪd] ['eməri] [piːk]
examined . — Total number , 109 , as follows : Texas : cave W side Emory Peak
检查 . — 全部的 数字 , - , 作为 跟随 : 德克萨斯州 : 洞穴 W 边 埃默里大学 顶峰
, ['tʃiːsɑːs][ˌɛmˌtiː'ɛs] . ,
, Chisos Mts . ,
, 奇索斯 山脉 . ,

已检查——总数为109，具体如下：德克萨斯州：奇索斯山脉埃默里峰西侧洞穴，

['bruːstə(r)][ˌsiː 'əʊ] . , - [ˌef 'tiː] . , [faɪv] ['spesəmən] ([ə; eɪ][ænd; ənd][em] ['kɒlɪdʒ] [ɒv; əv] ['teksəs]) .
Brewster Co . , 7500 ft . , 5 specimens (A and M College of Texas) .
布鲁斯特 合作 . , - 英尺 . , 5 标本 (一个 和 M 大学 的 德克萨斯州) .

布鲁斯特县，7500 英尺，5 个标本（德克萨斯州 A 和 M 学院）。

[ˌkoʊə'wiːlə] : - [miː] . [es][ænd; ənd][ˌtuː'tuː][miː] .
Coahuila : 12 mi . S and 2 mi .
科阿韦拉 : - 米 . S 和 2 米 .

科阿韦拉：南 12 英里，南 2 英里。

[iː][ˌɑːrteɪ'ɑːgə] , - [ˌef 'tiː] . , - ([kuː]) .
E Arteaga , 7500 ft . , 24 (KU) .
E 阿尔特加 , - 英尺 . , - (堪萨斯大学) .

E Arteaga，7500 英尺，24（KU）。

['nweɪvoʊ][lei'əun] : ['sɛroʊ][pə'toʊsiː] , [ˌmjuːnɪ'sɪpɪəʊ][diː][geɪliːænə] , - , - [ˌef 'tiː] . , - ([ʃɪ'kɑːgəʊ][næt] .
Nuevo León : Cerro Potosí , Municipio de Galeana , 11 , 500 ft . , 80 (Chicago Nat .
新 莱昂 : 塞罗 波托西 , 市政 德 加莱阿纳 , - , - 英尺 . , - (芝加哥 纳特 .
[hɪst] .
Hist .
历史 .

新莱昂州：Cerro Potosí，Municipio de Galeana，11, 500 英尺，80（芝加哥国家队）

[mʌs] .) .
Mus .) .
音乐 .) .

音乐）。

[trænz'mɪtɪd] [dɪ'sembə(r)][faɪv] , - .
Transmitted December 5 , 1955 .
传输 十二月 5 , - .

1955年12月5日播出。

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

听书破万卷
开口如有神